

第3世代のアレルギー検査 アラスタット3g* 【アレルゲン一覧表】

低濃度域 (0.1 IU_A/mL) から高濃度域 (500 IU_A/mL) まで精度よく測定ができます。

<p>たまご</p>  <p>卵白 卵黄 オボムコイド</p>	<p>魚・魚卵</p>  <p>サケ マグロ アジ サバ イワシ タラ カレイ イクラ タラコ</p>	<p>くだもの</p>  <p>リンゴ バナナ キウイ メロン モモ オレンジ イチゴ マンゴー 洋ナシ スイカ グレープフルーツ アボカド</p>	<p>ペット (動物)</p>  <p>ネコ上皮・皮膚 イヌ皮膚 イヌ上皮 ハムスター上皮 ウマ皮膚 ウシ皮膚 家兎上皮 ラット マウス モルモット上皮 マウス上皮 ラット上皮 ラット血清蛋白 ヤギ上皮 羊上皮 豚上皮 アヒル羽毛 セキセイインコ羽毛 ハトのフン ガチョウ羽毛</p>	<p>樹木 (春の花粉)</p>  <p>スギ ヒノキ カエデ (属) ハンノキ (属) シラカンバ (属) コナラ (属) ブナ (属) マツ (属) クワ (属) ビャクシン (属) ニレ (属) オリーブ クルミ (属) ヤナギ (属) アカシア (属) ホソイトスギ</p>	<p>イネ科 (春～夏の花粉症)</p>  <p>ハルガヤ ギョウギシバ カモガヤ ヒロハウシノケグサ ホンムギ オオアワガエリ アシ ナガハグサ コヌカグサ (属) セイバンモロコシ 小麦 (属) (花粉) オオスズメノテッポウ スズメノヒエ (属)</p>	<p>雑草 (夏～秋の花粉症)</p>  <p>ブタクサ ブタクサモドキ オオブタクサ ニセブタクサ ニガヨモギ ヨモギ フランスギク タンポポ (属) ヘラオオバコ シロザ アキノキリンソウ アオゲイトウ ヒメスイバ イラクサ (属) カナムグラ</p>	<p>ミックスアレルゲン</p> <p>真菌パネル ペニシリウム クラドスポリウム アスペルギルス カンジダ アルテルナリア</p> <p>動物パネル2 ネコ上皮・皮膚 イヌ皮膚 モルモット上皮 ラット マウス</p> <p>雑草パネル5 ブタクサ ヨモギ フランスギク タンポポ (属) アキノキリンソウ</p> <p>イネ科植物パネル5 ハルガヤ ギョウギシバ カモガヤ オオアワガエリ アシ</p> <p>食物パネル7 卵白 牛乳 小麦 米 ピーナッツ 大豆</p> <p>食物パネル4 小麦 トウモロコシ 米 ゴマ ソバ</p>
<p>乳製品</p>  <p>牛乳 CHEDDARチーズ モールドチーズ カゼイン α-ラクトアルブミン β-ラクトグロブリン</p>	<p>穀物・まめ類</p>  <p>小麦 ピーナッツ 大豆 米 ソバ ゴマ グルテン トウモロコシ ライ麦 大麦 オート麦 エンドウ インゲン アーモンド ココナッツ ハシバミの実 (ヘーゼルナッツ) ブラジルナッツ ペカンナッツ カシューナッツ カカオ クルミ</p>	<p>野菜・その他の食品</p>  <p>トマト ニンジン ジャガイモ ヤマイモ サツマイモ セロリ パセリ タマネギ タケノコ ホウレン草 レタス カボチャ ニンニク 麦芽 ビール酵母 マスタード</p>	<p>室内のホコリ</p>  <p>ヤケヒョウヒダニ コナヒョウヒダニ アシフトコナダニ サヤアシニクダニ ケナガコナダニ イエニクダニ ハウスダスト1 ハウスダスト2 ハウスダスト6</p>	<p>カビ</p>  <p>ペニシリウム クラドスポリウム アスペルギルス ムコール カンジダ アルテルナリア マラセチア ヘルミントンスポリウム フザリウム ステムフィリウム リゾプス オーレオバシジウム フォーマ エピコッカム カーブラリア トリコフィトン (白癬菌)</p>	<p>昆虫</p>  <p>ガ ユスリカ (属) ゴキブリ ヤブカ</p>	<p>その他</p> <p>ラテックス 綿 アニサキス 黄色ブドウ球菌・ エンテロトキシンA 黄色ブドウ球菌・ エンテロトキシンB ゼラチン</p>	