Manfred Fichter y Norbert Quadflieg

SIAB–Ex Entrevista para expertos

SIAB-EX Algoritmos según el ICD-10

Copyright by Manfred Fichter

S: Sí N: No ¡Por favor, marque la respuesta correspondiente!

Nombre: _____ No del probando.: _____

SIAB-EX-Diagnóstico de Anorexia Nerviosa según el ICD-10 (F50.0, F50.1)

	Criterio cumplido ahora	Criterio cumplido antes
A Pérdida de peso o, en caso de niños, falta de aumento de peso. Esto lleva a un peso de, como mínimo, un 15% menos del peso normal o el peso esperado para la edad y estatura.		
Edad / BMI Mujeres / BMI Hombres / Sexo m/f 10-12 / ≤ 14.9 / ≤ 15.0 13-14 / ≤ 16.0 / ≤ 16.3 — Edad ahora _ — BMI ahora _ — ahora criterio cumplido ⇒	S/N	
15-16 / ≤ 16.8 / ≤ 17.2 a partir de 17 / ≤ 17.6 / ≤ 18.6 — Edad mín. _ — BMI mín. _ — antes: criterio cumplido ⇒		S/N
B La pérdida de peso se provoca conscientemente evitando alimentos que "engordan".		
Pregunta 12 ahora: __ antes: __ (POR FAVOR, TRANSCRIBA LOS VALORES DE LA ENTREVISTA) ahora:código 2-4 ⇒	S/N	
antes: código 2-4 ⇒		S/N
C Percepción propia de "demasiado gordo" relacionada con un miedo atroz a engordar demasiado. Los afectados establecen para ellos mismos un límite de peso muy bajo.		
Pregunta 16 ahora: __ Ahora código 2-4: S/N O Pregunta 7 ahora: __ ahora: código 2-4: S/N O Pregunta 8 Deseo-BMI ahora __ Deseo-BMI ahora ≤ 17.6 (mujeres) S/N o ≤ 18.6 (hombres) ahora: mín. 1 vez Sí ⇒	S/N	
Pregunta 16 antes: __ antes: código 2-4: S/N O Pregunta 7 antes __ antes: código 2-4: S/N O Pregunta 9 Deseo-BMI Min. __ Deseo-BMI Min. ≤ 17.6 (mujeres) S/N o ≤ 18.6 (hombres) antes.: mín. 1 vez Sí ⇒		S/N
D Trastorno endocrino extenso del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas; en las mujeres se manifiesta como amenorrea y en los hombres como pérdida de interés por la sexualidad y pérdida de potencia.		
Mujeres: Pregunta 19 ahora: _ antes: _ Hombres: Pregunta 75 ahora: _ antes: _ ahora:¿Código. 2-5, 8 (Mujeres) o Código 2-4 (Hombres)?⇒	S/N	
antes: ¿Código 2-5, 8 (Mujeres) o Código 2-4 (Hombres)?⇒		S/N
Suma **A-D** Sí: (0-4)		
E Los criterios **A** y **B** para una bulimia nerviosa (F50.2) no se cumplen.	S/N	S/N
UTILÍZESE LA HOJA DE DIAGNÓSTICO SIAB-EX-BULIMIA NERVIOSA SEGÚN EL ICD-10 (F50.2)		
Suma **A-E** Sí: (0-5)		

Diagnóstico ahora: ahora: ¿Suma A-E Sí = 5? Criterios para **Diagnóstico AN (F50.0) ahora** cumplidos S/N
Diagnóstico antes: antes: ¿Suma A-E Sí = 5? Criterios para D**iagnóstico AN (F50.0) antes** cumplidos S/N

Diagnóstico (AN atípico) ahora: ¿Suma A-D Sí=4? Criterios para **Diagnóstico AN atíp. (F50.1) ahora c**umplidos S/N
Diagnóstico (AN atípico) antes: ¿Suma A-D Sí=4? Criterios para **Diagnóstico AN atíp. (F50.1) antes** cumplidos S/N

S: Sí N: No ¡Por favor, marque la respuesta correspondiente!

Nombre: _____ Pbnr.: _____

SIAB-EX - Diagnóstico de Bulimia Nerviosa según el ICD-10 (F50.2)

	Criterio cumplido ah.	a.
A Episodios frecuentes de ataques compulsivos de comer (en un período de tres meses al menos 2 veces por semana), en los que se consumen grandes cantidades de alimento en muy poco tiempo.		
Pregunta 21 a ahora: __ antes: __ Pregunta 23 ahora: __ antes: __ (POR FAVOR, TRANSCRIBA LOS VALORES DE LA ENTREVISTA)		
ahora código 2-4: S/N Y ahora código 2-4: S/N ahora: ¿2 veces Sí? ⇒	S/N	
antes código 2-4: S/N Y antes código 2-4: S/N antes: ¿2 veces Sí? ⇒		S/N
B Preocupación constante por la comida, compulsión por comer o voracidad		
Pregunta 60 ahora: __ antes: __ Pregunta 34 ahora: __ antes: __		
ahora código 2-4: S/N O ahora código 2-4: S/N ahora: ¿mín. 1 vez Sí? ⇒	S/N	
antes código 2-4: S/N O antes código 2-4: S/N antes: ¿mín. 1 vez Sí? ⇒		S/N
C Los pacientes intentan combatir el aumento de peso a través de la alimentación con uno o varios de los siguientes comportamientos contrarrestantes		

Marque con una cruz el código

Pregunta	Código (ahora)	Código (antes)
	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
35 Vómitos	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
36 Laxantes	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
37 Diuréticos	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
38 Inhibidores del apetito	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
39 Medicamentos para el tiroides	8 0 1 2 3 4	8 0 1 2 3 4
40 Tratamiento de insulina	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
41 Ayuno excesivo	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
42 Revulsivos		

¿al menos 1 codificación en esta columna? ⇒ S/N

¿al menos una codificación en esta columna? ⇒ S/N

D Percepción propia de “demasiado gordo” relacionada con un el miedo a engordar demasiado (lo que conduce en la mayoría de los casos a un peso insuficiente).		
Pregunta 16 ahora: __ antes: __ Pregunta 7 ahora: __ antes: __		
ahora código 2-4: S/N O ahora código 2-4: S/N ahora: ¿mín. 1 vez Sí? ⇒	S/N	
antes código 2-4: S/N O antes código 2-4: S/N antes: ¿mín 1 vez Sí? ⇒		S/N
Suma Sí: (0-4)		

Diagnóstico ahora: ahora: ¿Suma Sí = 4? Criterios para **Diagnóstico BN ahora** cumplidos S/N
Diagnóstico anterior: antes: ¿Suma Sí = 4? Criterios para **Diagnóstico BN antes** cumplidos S/N

S: Sí N: No ¡Por favor, marque la respuesta correspondiente!