Manfred Fichter y Norbert Quadflieg

SIAB-S Cuestionario de autoevaluación

SIAB-S Algoritmos según el ICD-10

Copyright by Manfred Fichter

ah.: ahora a.: antes S: Sí N: No Marque la respuesta adecuada

Nombre: _____ N^{o} del probando :_____

SIAB-S-Diagnóstico de Anorexia Nerviosa según el ICD-10 (F50.0, F50.1)

	Criterio cumplido ahora	Criterio cumplido antes
A Pérdida de peso o, en caso de niños, falta de aumento de peso. Esto lleva a un peso de, como mínimo, un 15% menos del peso normal o del peso expectado para la edad y estatura.		
Edad / BMI Mujeres / BMI Hombres / Sexo m/f 10-12 / ≤ 14.9 / ≤ 15.0 13-14 / ≤ 16.0 / ≤ 16.3 — Edad ahora _ BMI ahora _ ahora: Criterio cumplido ⇒ 15-16 / ≤ 16.8 / ≤ 17.2 a partir de 17 / ≤ 17.6 / ≤ 18.6 — Edad mín. _ BMI mín. _ antes: Criterio cumplido ⇒	S/N	S/N
B La pérdida de peso es provocada conscientemente evitando alimentos que "engordan".		
Pregunta 12 ahora: __ antes: __ (POR FAVOR, TRANSCRIBA LOS VALORES DE LA ENTREVISTA) ahora: Código 1-4 ⇒ / antes: Código 1-4 ⇒	S/N	S/N
C Percepción propia de "demasiado gordo" relacionada con el temor a engordar demasiado. Los afectados establecen para ellos mismos un límite de peso muy bajo.		
Pregunta 16 ahora: __ ahora: código 1-4: S/N O Pregunta 7 ahora: __ ahora: código 1-4:S/N O Pregunta 8 Deseo-BMI ahora __ Deseo-BMI ahora ≤ 17.6 (mujeres) S/N o ≤ 18.6 (hombres) ahora: mín. 1 vez Sí⇒	S/N	
Pregunta 16 a.: __ antes: código 1-4: S/N O Pregunta 7 a.: __ antes: código 1-4: S/N O Pregunta 9 Deseo-BMI mín. __ Deseo-BMI mín. ≤ 17.6 (mujeres) S/N o ≤ 18.6 (hombres) antes: mín. 1 vez Sí⇒		S/N
D Trastorno endocrino extenso del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas; en mujeres se manifiesta como amenorrea y en hombres como pérdida de interés por la sexualidad y pérdida de potencia.		
Mujeres: Pregunta 19 ahora: _ antes: _ Hombres: Pregunta 75 ahora: _ antes: _ ahora:¿cód. 2-5, 8 (mujeres) o cód. 2-4 (hombres)?⇒ / antes:¿cód. 2-5, 8 (mujeres) o cód. 2-4 (hombres)?⇒	S/N	S/N
Suma **A-D** Sí: (0-4)		
E Los criterios **A** y **B** para una bulimia nerviosa (F50.2) no se cumplen. UTILÍZE HOJA DE DIAGNÓSTICO SIAB-EX-DIAGNÓSTICO BULIMIA NERVIOSA SEGÚN EL ICD-10 (F50.2)	S/N	S/N
Suma **A-E** Sí: (0-5)		

Diagnóstico ahora: ahora:¿Suma A-E Sí = 5? Criterios para **Diagnóstico AN (F50.0) ahora** cumplidos S/N
Diagnóstico antes: antes: ¿Suma A-E Sí = 5? Criterios para D**iagnóstico AN (F50.0) antes** cumplidos S/N

Diagnóstico (AN atípico) ahora: ¿Suma A-D Sí=4? Criterios para **Diagnóstico AN atíp. (F50.1) ahora** cumplidos S/N
Diagnóstico (AN atípico) antes: ¿Suma A-D Sí=4? Criterios para **Diagnóstico AN atíp. (F50.1) antes** cumplidos S/N

S: Sí N: No ¡Por favor marque con una cruz las respuestas correpondientes!

ah.: ahora a.: antes S: Sí N: No Marque la respuesta adecuada

Nombre: _____ N^{o} del Probando: _____

SIAB-S - Diagnóstico de Bulimia Nerviosa según el ICD-10 (F50.2)

	Criterio cumplido ahora	Criterio cumplido antes
A Episodios frecuentes de ataques compulsivos de comer (en un período de tres meses al menos 2 veces por semana), en los que se consumen grandes cantidades de alimento en muy poco tiempo.		
Pregunta 21a ahora: __ antes: __ Y Pregunta 23 ahora: __ antes: __ (POR FAVOR, TRANSCRIBA LOS VALORES DE LA ENTREVISTA)		
ahora código 2-4: S/N Y ahora código 2-4: S/N ahora: ¿2 veces Sí? ⇒	S/N	
antes código 2-4: S/N Y antes código 2-4: S/N antes: ¿2 veces Sí? ⇒		S/N
B Preocupación constante por la comida, ansia irresistible o presión por comer.		
Pregunta 60 ahora: __ antes: __ Pregunta 34 ahora: __ antes: __		
ahora código 2-4: S/N O ahora código 2-4: S/N ahora: ¿1 vez Sí? ⇒	S/N	
antes código 2-4: S/N O antes código 2-4: S/N antes: 1 vez Sí? ⇒		S/N
C Los pacientes intentan combatir el aumento de peso a través de la alimentación con uno o varios de los siguientes comportamientos.		
¿mín 1 codificación en esta columna? ⇒		S/N
¿mín 1 codificación en esta columna? ⇒	S/N	
D Percepción propia de "demasiado gordo" relacionada con el temor a engordar demasiado (lo que conduce en la mayoría de los casos a un peso insuficiente).		
Pregunta 16 ahora: __ antes: __ Pregunta 7 ahora: __ antes: __		
ahora código 1-4: S/N O ahora código 1-4: S/N ahora: ¿al menos 1 vez Sí? ⇒	S/N	
antes código 1-4: S/N O antes código 1-4: S/N antes: ¿al menos 1 vez Sí? ⇒		S/N
Suma Sí: (0-4)		

Marque con una cruz el código

Pregunta	Código (ah.)		Código (a.)	
35 Vómitos	0	1 2 3 4	0	1 2 3 4
36 Laxantes	0	1 2 3 4	0	1 2 3 4
37 Diuréticos	0	1 2 3 4	0	1 2 3 4
38 Inhibidores del apetito	0	1 2 3 4	0	1 2 3 4
39 Medicamentos para el tiroides	0	1 2 3 4	0	1 2 3 4
40Tratamiento de insulina	8 0	1 2 3 4	8 0	1 2 3 4
41 Ayuno excesivo	0	1 2 3 4	0	1 2 3 4
44 Revulsivos	0	1 2 3 4	0	1 2 3 4

Diagnóstico ahora: ahora: ¿Suma Sí = 4? Criterios para **Diagnóstico BN ahora** cumplidos S/N

Diagnóstico anterior: antes: ¿Suma Sí = 4? Criterios para **Diagnóstico BN antes** cumplidos S/N

S: Sí N: No ¡Por favor marque con una cruz las respuestas correpondientes!

ah.: ahora a.: antes S: Sí N: No Marque la respuesta adecuada