Manfred Fichter y Norbert Quadflieg

SIAB-EX

Hoja de evaluación de la puntuación total para la SIAB-EX
ANTES

Apellido: .....

Nombre: .....

Fecha de nacimiento: .....

Fecha de la entrevista: .....

	Item	Nº de item	Puntuación 0-4
I	**Esquema corporal e ideal de delgadez (BI)**		
	Trastornos del esquema corporal	16	
	Miedo a ganar peso	7	
	Fijación mental en figura delgada	61	
	Peso insuficiente (modificado)	1*	
	Restricción cualitativa de la nutrición	12	
	Conductas compulsivas con respeto a la comida	59	
	Exceso de movimiento	42	
	Fijación mental en a la comida	60	
	Escupir alimentos	14	
	Orientación interior al rendimiento	3	
	Dependencia de la autoestima de figura y peso	10	
	Límites calóricos	13	
	Amenorrea (modificado)	19**	
	Estreñimiento	55	
	Rumiarción	15	
	Negación del peligro de peso insuficiente	17***	
Valor total de la subescala I			
Valor medio de la subescala I (total:número de items contestados)			

Copyright by Manfred Fichter

Hoja de evaluación de la puntuación total de la SIAB-EX Antes b)

	Item	Nº de item	Puntuación 0-4
II	**Psicopatología general (GenPsy)**		
	Confianza reducida en las propias capacidades	66	
	Pensamientos depresivos	65	
	Estado de ánimo depresivo	64	
	Disminución de la autoestima	67	
	Miedos	4	
	Alteraciones del sueño	6	
	Sensación de insuficiencia propia y de indefensión	62	
	Pensamientos y cavilaciones compulsivas	58	
	Pensamientos suicidas	68	
	Fobias	5	
	Control y repetición compulsivos	56	
	Actos suicidas	69	
	Conductas autoagresivas	70	
	Limpieza compulsiva	57	
Valor total de la subescala II			
Valor medio de la subescala II (total:número de items contestados)			
III	**Sexualidad e integración social (SexSoc)**		
	Conducta sexual	78	
	Miedos sexuales	76	
	Falta de organización activa del tiempo libre	78	
	Evitar contactos	82	
	Disminución de necesidades sexuales	75***	
	Estabilidad de la relación de pareja	77	
	Calidad de los contactos sociales	81	
	Negación de la enfermedad	83***	
	Evaluación global de los síntomas	84***	
	Disminución de los contactos sociales	80	
	Perjuicio real	53	
	Percepción disminuida de estímulos internos	63	
Valor total de la subescala III			
Valor medio de la subescala III (total:número de items contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total de la SIAB-EX Antes c)

	Item	Nº de item	Puntuación 0-4
IV	**Síntomas bulímicos (Bul)**		
	Ataques compulsivos de comer (objetivos)	21a	
	Frecuencia de ataques compulsivos de comer (3 meses)	23***	
	Ataques compulsivos de comer (subjetivos)	21b	
	Pérdida del control	26***	
	Sensación de sufrimiento o de preocupación en relación con los ataques compulsivos de comer	28***	
	Vómitos	35	
	Compulsión por comer o voracidad	34	
	Transcurso temporal de los ataques compulsivos de comer	22	
Valor total de la subescala IV			
Valor medio de la subescala IV (total:número de items contestados)			
V	**Medidas para contrarrestar, ayuno, abuso de sustancias (Counteract)**		
	Inhibidores del apetito	38	
	Diuréticos	37	
	Ayuno excesivo	41	
	Tranquilizantes	72	
	Drogas	73	
	Abuso de laxantes	36	
	Restricción cuantitativa de la nutrición	11	
	Alcohol	71	
	Medicamentos para aumentar la actividad del tiroides	39	
	Enemas	43	
	Revulsivos	44	
Valor total de la subescala V			
Valor medio de la subescala V (total:número de items contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total de la SIAB-EX Antes d)

	Item	Nº de item	Puntuación 0-4
VI	**Ataques compulsivos de comer atípicos (Atyp. Binge)**		
	Frecuencia de ataques compulsivos de comer atípicos (3 meses)	31***	
	Ataques compulsivos de comer atípicos	29	
	Aumento de la cantidad de comida ingerida bajo estrés y agobio	33	
	Agradable sensación de saturación después de ataques compulsivos de comer	30***	
Valor total de la subescala VI			
Valor medio de la subescala VI (total:número de items contestados)			
Valor total de la escala general de SIAB-EX			
Valor medio la escala general de SIAB-S (total:número de items contestados)			

Notas explicativas referentes a la hoja de evaluación del resultado de puntuación total

*Cálculo de peso insuficiente:

BMI	Puntuación de peso insuficiente
> 19.00	0
19.00 - 17.51	1
17.50 - 16.01	2
16.00 - 14.51	3
<= 14.50	4

** Recodificación de item 19 como sigue:

- recodificar 6,7 u 8 en 0
- recodificar 2 en 1
- recodificar 3 en 2
- recodificar 4 ó 5 en 3
- Las codificaciones 1 y 9 permanecen iguales

*** Item 23 y 31: recodificar 5 en 1
Item 75 y 84: recodificar 7 en 0
Item 17, 83, 26 y 28: recodificar 8 en 0
Item 30: recodificar 5, 6, 7 u 8 en 0

Hoja de evaluación de la puntuación total para la entrevista SIAB-EX
Últimos 3 meses

Apellido: .....

Nombre: .....

Fecha de nacimiento: .....

Fecha de la entrevista: .....

	Item	Nº de item	Puntuación 0-4
I	**Esquema corporal e ideal de delgadez (BI)**		
	Trastornos del esquema corporal	16	
	Miedo al aumento de peso	7	
	Fijación mental en figura delgada	61	
	Restricción cualitativa de la nutrición	12	
	Conductas compulsivas con respecto a la comida	59	
	Peso insuficiente (modificado)	1*	
	Límites calóricos	13	
	Fijación mental en la comida	60	
	Amenorrea (modificado)	19**	
	Orientación interior al rendimiento	3	
	Dependencia de la autoestima de figura y peso	10	
	Escupir alimentos	14	
	Exceso de movimiento	42	
	Estreñimiento	55	
	Percepción disminuida de estímulos internos	63	
	Negación de la enfermedad	83***	
	Rumiarción	15	
	Negación del peligro de peso insuficiente	17***	
Valor total de la subescala I			
Valor medio de la subescala I (total:número de items contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total de la SIAB-EX Últimos 3 meses b)

	Item	Nº de item	Puntuación 0-4
II	**Psicopatología general e integración social (GenPsySoc)**		
	Disminución de la autoestima	67	
	Confianza reducida en sus propias capacidades	66	
	Estado de ánimo depresivo	64	
	Pensamientos depresivos	65	
	Evitar contactos	82	
	Falta de organización activa del tiempo libre	79	
	Miedos	4	
	Pensamientos suicidas	68	
	Sensación de insuficiencia propia y de indefensión	62	
	Disminución de los contactos sociales	80	
	Alteraciones del sueño	6	
	Fobias	5	
	Perjuicio real	53***	
	Tranquilizantes	72	
	Pensamientos y cavilaciones compulsivas	58	
	Calidad de los contactos sociales	81	
	Limpieza compulsiva	57	
	Control y repetición compulsivos	56	
	Actos suicidas	69	
Valor total de la subescala II			
Valor medio de la subescala II (total:número de items contestados)			
III	**Sexualidad (Sex)**		
	Conducta sexual	78	
	Estabilidad de la relación de pareja	77	
	Miedos sexuales	76	
	Disminución de necesidades sexuales	75***	
Valor total de la subescala III			
Valor medio de la subescala III (total:número de items contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total de la SIAB-EX Últimos 3 meses c)

	Item	Nº de item	Puntuación 0-4
IV	**Síntomas bulímicos (Bul)**		
	Frecuencia de ataques compulsivos de comer (3 meses)	23***	
	Ataques compulsivos de comer (objetivos)	21a	
	Ataques compulsivos de comer (subjetivos)	21b	
	Pérdida del control	26***	
	Sensación de sufrimiento o de preocupación en relación con los ataques compulsivos de comer	28***	
	Vómitos	35	
	Compulsión por comer o voracidad	34	
	Evaluación global de los síntomas	84***	
	Transcurso temporal de los ataques compulsivos de comer	22	
Valor total de la subescala IV			
Valor medio de la subescala IV (total:número de items contestados)			
V	**Medidas para contrarrestar, ayuno, abuso de sustancias (Counteract)**		
	Inhibidores del apetito	38	
	Ayuno excesivo	41	
	Abuso de laxantes	36	
	Drogas	73	
	Conducta autoagresiva	70	
	Diuréticos	37	
	Restricción cuantitativa de la nutrición	11	
	Alcohol	71	
	Medicamentos para aumentar la actividad del tiroides	39	
	Enemas	43	
	Revulsivos	44	
Valor total de la subescala V			
Valor medio de la subescala V (total:número de items contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total de la SIAB-EX Antes d)

	Item	Nº de item	Puntuación 0-4
VI	**Ataques compulsivos de comer atípicos (Atyp. Binge)**		
	Ataques compulsivos de comer atípicos	29	
	Frecuencia de ataques compulsivos de comer atípicos (3 meses)	31***	
	Aumento de la ingestión de comida en situaciones de estrés y agobio	33	
	Agradable sensación de saturación después de ataques compulsivos de comer	30***	
Valor total de la subescala VI			
Valor medio de la subescala VI (total:número de items contestados)			
Valor total de la escala general de SIAB-EX			
Valor medio la escala general de SIAB-EX (total:número de items contestados)			

Notas explicativas referentes a la hoja de evaluación del resultado de puntuación total

*Cálculo de peso insuficiente:

BMI	Puntuación de peso insuficiente
> 19.00	0
19.00 - 17.51	1
17.50 - 16.01	2
16.00 - 14.51	3
<= 14.50	4

** Recodificación del item 19 como sigue:
- recodificar 6,7 u 8 en 0
- recodificar 2 en 1
- recodificar 3 en 2
- recodificar 4 ó 5 en 3
- Las codificaciones 1 y 9 permanecen iguales

*** Item 23 y 31: recodificar 5 en 1
Items 75 y 84: recodificar 7 en 0
Items 17, 83, 26 y 28: recodificar 8 en 0
Item 30: recodificar 5, 6, 7 ó 8 en 0
Item 53: recodificar 8 en 4