Manfred Fichter y Norbert Quadflieg

SIAB

Hoja de evaluación SIAB-S

Hoja de evaluación de la puntuación total para el cuestionario SIAB-S

Antes

Apellido: .....

Nombre: .....

Fecha de nacimiento: .....

Fecha de la entrevista: .....

	Apartado	Nº de apartado	Puntuación 0-4
I	**Síntomas bulímicos (Bul)**		
	Ataques compulsivos de comer (subjetivos)	21b	
	Frecuencia de ataques compulsivos de comer	23***	
	Ataques compulsivos de comer (objetivos)	21a	
	Sensación de sufrimiento o de preocupación en relación con los ataques compulsivos de comer	28***	
	Compulsión por comer o voracidad	34	
	Vómitos	35	
	Pérdida de control	26***	
	Transcurso temporal de los ataques compulsivos de comer	22	
	Evaluación global de los síntomas	84	
	Negación de la enfermedad	83	
Valor total de la subescala I			
Valor medio de la subescala I (suma:número de apartados contestados)			

Copyright by Manfred Fichter

Hoja de evaluación de la puntuación total del SIAB-S Antes b)

	Apartado	Nº de apartado	Puntuación 0-4
II	**Psicopatología general (GenPsy)**		
	Disminución de la autoestima	67	
	Pensamientos depresivos	65	
	Confianza reducida en las propias capacidades	66	
	Sensación de insuficiencia propia y de desamparo	62	
	Pensamientos y cavilaciones compulsivas	58	
	Estado de ánimo depresivo	64	
	Pensamientos suicidas	68	
	Fobias	5	
	Miedos	4	
	Limpieza compulsiva	57	
	Control y repetición compulsivos	56	
	Percepción disminuida de estímulos internos	63	
	Alteraciones del sueño	6	
	Perjuicio real	53	
Valor total de la subescala II			
Valor medio de la subescala II (suma:número de apartados contestados)			
III	**Ideal de delgadez (Slim)**		
	Restricción cualitativa de la nutrición	12	
	Restricción cuantitativa de la nutrición	11	
	Límites calóricos	13	
	Miedo al aumento de peso	7	
	Fijación mental en figura delgada	61	
	Fijación mental en la comida	60	
	Dependencia de la autoestima de figura y peso	10	
	Medicamentos para aumentar la actividad del tiroides	39	
	Orientación interior al rendimiento	3	
Valor total de la subescala III			
Valor medio de la subescala III (suma:número de apartados contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total del SIAB-S Antes c)

	Apartado	Nº de apartado	Puntuación 0-4
IV	**Sexualidad e integración social (SexSoc)**		
	Disminución de los contactos sociales	80	
	Evitar contactos	82	
	Conducta sexual	78	
	Calidad de los contactos sociales	81	
	Falta de organización activa del tiempo libre	79	
	Miedos sexuales	76	
	Disminución de necesidades sexuales	75***	
	Estabilidad de la relación de pareja	77	
Valor total de la subescala IV			
Valor medio de la subescala IV (suma:número de apartados contestados)			
V	**Esquema corporal (BI)**		
	Peso insuficiente (modificado)	1*	
	Trastornos del esquema corporal	16***	
	Escupir alimentos	14	
	Amenorrea (modificado)	19**	
	Comportamientos compulsivos con respecto a la comida	59	
	Exceso de movimiento	42	
	Rumiación	15	
	Estreñimiento	55	
	Negación del peligro del peso insuficiente	17***	
Valor total de la subescala V			
Valor medio de la subescala V (suma:número de apartados contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total del SIAB-S Antes d)

	Apartado	Nº de apartado	Puntuación 0-4
VI	**Medidas para contrarrestar, abuso de sustancias, ayuno y autoagresión (Counteract)**		
	Inhibidores del apetito	38	
	Tranquilizantes	72	
	Diureticos	37	
	Actos suicidas	69	
	Abuso de laxantes	36	
	Drogas	73	
	Conductas autoagresivas	70	
	Alcohol	71	
	Ayuno excesivo	41	
	Enemas	43	
	Revulsivos	44	
Valor total de la subescala VI			
Valor medio de la subescala VI (suma:número de apartados contestados)			
VII	**Ataques compulsivos de comer atípicos (Atyp. Binge)**		
	Frecuencia de ataques compulsivos de comer atípicos (3 meses)	31***	
	Ataques compulsivos de comer atípicos	29	
	Aumento de la cantidad de comida ingerida bajo estrés y agobio	33	
	Agradable sensación de saturación después de ataques compulsivos de comer	30***	
Valor total de la subescala VII			
Valor medio de la subescala VII (total:número de apartados contestados)			
Valor total de la escala general del SIAB-S			
Valor medio la escala general del SIAB-S (total:número de apartados contestados)			

Notas explicativas referentes a la hoja de evaluación del total de resultados

*Cálculo de peso insuficiente: BMI

Resultado para peso insuficiente

> 19.00	0
19.00 - 17.51	1
17.50 - 16.01	2
16.00 - 14.51	3
<= 14.50	4

** Recodificación de apartado 19 como sigue:

- recodificar 6,7 u 8 en 0
- recodificar 2 en 1
- recodificar 3 en 2
- recodificar 4 ó 5 en 3

Las codificaciones 1 y 9 permanecen iguales

*** Apartado 16 y 75: recodificar 5 en 0
Apartado 23 y 31: recodificar 5 en 1
Apartado 17, 26 y 28: recodificar 8 en 0
Apartado 30: recodificar 5, 6, 7 u 8 en 0

Hoja de evaluación de la puntuación total para el cuestionario SIAB-S
Últimos 3 meses

Apellido: .....

Nombre: .....

Fecha de nacimiento: .....

Fecha de la entrevista: .....

	Apartado	Nº de apartado	Puntuación 0-4
I	**Psicopatología general e integración social (GenPsySoc)**		
	Disminución de la autoestima	67	
	Estado de ánimo depresivo	64	
	Sensación de insuficiencia propia y de indefensión	62	
	Evitar contactos	82	
	Confianza reducida en las propias capacidades	66	
	Miedos	4	
	Disminución de los contactos sociales	80	
	Pensamientos depresivos	65	
	Pensamientos suicidas	68	
	Falta de organización activa del tiempo libre	79	
	Perjuicio real	53	
	Fobias	5	
	Percepción disminuida de estímulos internos	63	
	Pensamientos y cavilaciones compulsivas	58	
	Control y repetición compulsivos	56	
	Calidad de los contactos sociales	81	
	Alteraciones del sueño	6	
	Negación de la enfermedad	83	
	Limpieza compulsiva	57	
	Actos suicidas	69	
	Tranquilizantes	72	
Valor total de la subescala I			
Valor medio de la subescala I (total:número de apartados contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total del SIAB-S Últimos 3 meses b)

	Apartado	Nº de apartado	Puntuación 0-4
II	**Síntomas bulímicos (Bul)**		
	Frecuencia de ataques compulsivos de comer (3 meses)	23***	
	Ataques compulsivos de comer (subjetivos)	21b	
	Ataques compulsivos de comer (objetivos)	21a	
	Sensación de sufrimiento o de preocupación en relación con los ataques compulsivos de comer	28***	
	Compulsión por comer o voracidad	34	
	Pérdida de control	26***	
	Vómitos	35	
	Evaluación global de los síntomas	84	
Valor total de la subescala II			
Valor medio de la subescala II (total:número de apartados contestados)			
III	**Esquema corporal e ideal de delgadez (BI)**		
	Restricción cuantitativa de la nutrición	11	
	Restricción cualitativa de la nutrición	12	
	Límites calóricos	13	
	Fijación mental en figura delgada	61	
	Miedo al aumento de peso	7	
	Dependencia de la autoestima de figura y peso	10	
	Fijación mental en la comida	60	
	Trastorno del esquema corporal	16***	
	Orientación interior al rendimiento	3	
	Exceso de movimiento	42	
	Negación del peligro del peso insuficiente	17***	
Valor total de la subescala III			
Valor medio de la subescala III (total:número de apartados contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total del SIAB-S Últimos 3 meses c)

	Apartado	Nº de apartado	Puntuación 0-4
IV	**Sexualidad y peso (SexWeight)**		
	Conducta sexual	78	
	Amenorrea (modificado)	19**	
	Peso insuficiente (modificado)	1*	
	Estabilidad de la relación de pareja	77	
	Miedos sexuales	76	
	Disminución de necesidades sexuales	75***	
	Comportamientos compulsivos con respecto a la comida	59	
Valor total de la subescala IV			
Valor medio de la subescala IV (total:número de apartados contestados)			
V	**Medidas para contrarrestar, ayuno, abuso de sustancias (Counteract)**		
	Abuso de laxantes	36	
	Conductas autoagresivas	70	
	Estreñimiento	55	
	Inhibidores del apetito	38	
	Ayuno excesivo	41	
	Escupir alimentos	14	
	Diuréticos	37	
	Drogas	73	
	Rumiación	15	
	Medicamentos para aumentar la actividad del tiroides	39	
	Alcohol	71	
	Enemas	43	
	Revulsivos	44	
Valor total de la subescala V			
Valor medio de la subescala V (total:número de apartados contestados)			

Hoja de evaluación de la puntuación total del SIAB-S Últimos 3 meses d)

	Apartado	Nº de apartado	Puntuación 0-4
VI	**Ataques compulsivos de comer atípicos (Atyp. Binge)**		
	Ataques compulsivos de comer atípicos	29	
	Frecuencia de ataques compulsivos de comer atípicos (3 meses)	31***	
	Aumento de la cantidad de comida ingerida bajo estrés y agobio	33	
	Agradable sensación de saturación después de ataques compulsivos de comer	30***	
Valor total de la subescala VI			
Valor medio de la subescala VI (total:número de apartados contestados)			
Valor total de la escala general del SIAB-S			
Valor medio la escala general del SIAB-S (total:número de apartados contestados)			

Notas exlicativas referentes a la hoja de evaluación
del resultado de puntuación total

	BMI	Puntuación de peso insuficiente
*Cálculo de peso insuficiente:	> 19.00	0
	19.00 - 17.51	1
	17.50 - 16.01	2
	16.00 - 14.51	3
	<= 14.50	4

** Recodificación de apartado 19 como sigue:
- recodificar 6, 7 u 8 en 0
- recodificar 2 en 1
- recalificar 3 en 2
- recodificar 4 ó 5 en 3
- Las codificaciones 1 y 9 permanecen iguales

*** Apartado 16 y 75: recodificar 5 en 0
Apartado 23 y 31: recodificar 5 en 1
Apartado 17, 26 y 28: recodificar 8 en 0
Apartado 30: recodificar 5, 6 u 8 en 0